

Advanced Endodontics

Scott L. Barry, DMD, PC

9020 SW Washington Square Rd., Suite 570, Tigard, OR 97223

Phone: (503) 718-0095 Fax: (503) 718-0097 * After hours emergency phone # 503-319-4094

INSTRUCCIONES de ANUNCIA-TRATAMIENTO

Su Tratamiento del Canal de la Raíz no es completo: • El tratamiento en el diente no es completo. Es esencial para usted volver a nuestra oficina para el tratamiento adicional. • No come nada para la primera hora que sigue el procedimiento y entonces come alimentos suaves sólo para el resto del día. Es conveniente mascar en el lado del contrario hasta que el tratamiento sea completado. Incluso si usted no experimentara ninguna molestia antes del tratamiento, es normal para usted experimentar algún grado de la molestia unos cuantos días. Esta ternura es normal y no es causa para la alarma. • La superficie exterior es llenada de un cemento temporario, que es duro y puede durar por muchas semanas. Sin embargo, esto no es pensado ser la restauración permanente para el diente, y debe ser reemplazado con una permanente que llena después de que su canal de raíz sea completado.

La molestia: • Incluso si usted no experimentara ninguna molestia antes del tratamiento, es normal para usted experimentar algún grado de la molestia unos cuantos días. Esta ternura es normal y no es causa para la alarma. La molestia puede ser aliviada tomando Aleve, ibuprofen (Advil), la aspirina, o el paracetamol (Tylenol) dirigido como. Caliente los aclarados del agua salada (1/2 cucharadita de sal en 8 onzas de agua) puede ayudar también. Si usted ya toma las medicinas tales como antibióticos, continúan por favor para tomar la medicina como dirigido. Debe experimentar la molestia que no puede ser controlada con el encima de medicinas, ni debe hinchándose desarrolla, contacta por favor nuestra oficina.

La hinchando/infección: • Aunque sea imposible predecir con la certeza, la hinchando/infección del poste-tratamiento no es esperada ocurrir después del tratamiento de endodontic. Así, el tratamiento antibiótico rutinario no es warrented. Sin embargo, investigación ha mostrado eso, en la ocasión (aproximadamente 2-6% de casos de endodontic) el dolor, hinchándose, y/o aflige puede desarrollar después de que el tratamiento de endodontic sea realizado (llamó "arranque"). Si esto ocurre, usted debe contactar nuestra oficina para el tratamiento adicional de estos síntomas (que puede incluir el tratamiento y/o las medicinas).

Si usted tiene ninguna pregunta, por favor no vacila en llamar nuestra oficina.

¡Tome Advil (ibuprofen) 800 mg/cada 8 horas para 2 - 3 días!! Si usted puede non tomar Advil, usted puede sustituir Tylenol, Alleve, etc (toma por favor como dirigido).